


## Genombrott för manligt preventivmedel

Den senaste utvecklingen inom manlig preventivteknik avslöjades nyligen vid kvinnliga kirurgers symposium på Ann Arbor Medical Center. Dr Sophie Merkin vid Merkin kliniken presenterade de preliminära resultaten från en undersökning utförd på 763 ovetande yngre manliga studenter vid ett större universitet i Mellanvästern. I sin rapport konstaterade dr Merkin att det nya preven-

tivmedlet – IPD – innebar ett genombrott i den manliga preventivtekniken. Det kommer att marknadsföras under varunamnet *Umbrelly*.

IPD (intrapenile device, 'intrapenil insats') liknar ett smalt, hopfällt paraply, som införs genom ollonet och trycks in i pungen med hjälp av ett kolvliknande instrument. I vissa fall perforeras pungen, men från detta kan



Teckning: Dawn Bracey

bortses då mannen har få nervändar på denna del av kroppen. Paraplyets undersida innehåller ett spermiedödande gelé (på engelska 'jelly', därav varunamnet *Umbrelly*).

Experiment utförda på 1 000 vita valar från kontinentalsockeln (vilkas sexualapparat lär vara den närmaste motsvarigheten till mannens) har visat att *Umbrelly* är hundra procentigt verksamt när det gäller att hindra produktionen av sperma, och ytterligt tillfredsställande för honvalen, eftersom det inte stör hennes sexuella njutning.

### *Infektion i pungen*

'Endast två dödsfall'

Dr Merkin förklarade *Umbrelly* vara ett statistiskt sett tryggt medel för män. Hon rapporterar att av de 763 studenterna med insatsen, dog endast två av infektion i pungen, och bara 20 drabbades av svullnad. På tre utvecklades testikelcancer, och 13 var alltför

deprimerade för att kunna få erektion. Hon konstaterar att de vanligaste klagomålen sträckte sig från kramper och blödningar till akuta smärtor i ljumskrakten. Hon betonade att dessa symptom blott var indikationer på att mannens kropp ännu inte anpassat sig till insatsen. Förhoppningsvis skulle symptomen försvinna inom ett års tid.

En av IDP orsakad komplikation som dr Merkin kort nämnde var risken för omfattande punginfektion, som skulle nödvändiggöra ett kirurgiskt avlägsnande av testiklarna. 'Detta inträffar dock endast i enstaka fall', sade Merkin, 'alltför sällan för att vara av statistisk betydelse.' Hon och andra framstående medlemmar av Women's College of Surgeons var överens om att fördelarna långt uppväger eventuella risker för enskilda individer.

*Artikeln är tidigare publicerad i ERIK, organ för Eslövs mansgrupp, samt i The Periodical Lunch, Ann Arbor, Michigan.*